

COMPOSITION ET TENEURS GARANTIES

Pentoxyde du Phosphore(P2O5) s.a.	27 ,0%
Oxyde de Potassium (K2O) s.a.	5,0%
Azote (N) Total	0,3%
Oxyde de Calcium (CaO) s.a.	0,28%
Oxyde de Magnésium (MgO) s.a.	0,1%
Fer (Fe) s.a.	36 ppm
Acides polyhydroxycarboxyliques	6,0%
Etat	Liquide soluble pour application par ferti-irrigation des plantes en agriculture

DESCRIPTION

Fosmax® est un produit particulièrement adapté pour le développement d'un puissant système racinaire, l'amélioration de la floraison de la plante, de la nouaison et de la maturation des fruits.

Avec sa formulation basée sur la présence du complexe polymère (FPC) capable de fixer le phosphore complexé d'un bas poids moléculaire, le potassium, le calcium et les oligo-éléments, Fosmax® permet une absorption rapide et une plus grande biodisponibilité que des engrais classiques. En outre, le complexe polymère (FPC) complexe les nutriments du sol non assimilables par la plante en les fixant et les rendant assimilables et absorbés par la racine.

NOM ET ADRESSE DU FOURNISSEUR

Industrias Químicas Fervalle
Oficinas: Calle Chile, 15 - 1º
30600 Archena - Murcia – Spain
Tél: +34 968 67 62 13
E-mail : info@fervalle.com
Site web : www.fervalle.com

USAGES DU PRODUIT

- Augmente l'enracinement obtenant un système racinaire puissant (racines et poils racinaires abondants).
- Favorise l'augmentation de la floraison, la nouaison des fruits et la précocité de leur maturation.
- Réactive le système racinaire qui a été endommagé et limite les dégâts causés par les Nématodes, Phytophthora et d'autres maladies du sol.
- Améliore l'absorption d'autres nutriments et des engrais grâce à la libération du complexe (FPC), qui parvient à extraire les nutriments non disponibles, ce qui les rend assimilables par la plante.
- Adapte le pH du bulbe et du sol obtenant une plus grande assimilation des nutriments.

DOSES ET MODE D'APPLICATION

Culture	Moment d'application	Dose d'utilisation	Besoins totaux par culture
Cultures maraîchères	A partir du 8ème jour de la plantation jusqu'à la sixième semaine de la culture.	5-10 L/Ha	70-90 L/Ha
Arbres fruitiers à noyaux et à pépins	Du début de la floraison jusqu'à la fin du grossissement du fruit.	5-10 L/Ha	70-90 L/Ha
Agrumes	De la première phase de la floraison à la récolte.	5-10 L/Ha	75-95 L/Ha
Jeunes plantations fruitières, agrumicoles, et viticoles	15 jours après plantation	5 L/Ha	50-70 L/Ha

INCOMPATIBILITES

Il est recommandé de ne pas mélanger avec des huiles, du calcium, du soufre ou des produits à réactivité alcaline.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Stockage dans l'emballage d'origine entre 5 ° C et 25 ° C pour préserver l'intégrité du produit.
- Bien agiter avant emploi

GARANTIES

- Les recommandations et les informations fournis sont les résultats de nombreux et rigoureux tests.
- Pendant l'utilisation, de nombreux facteurs hors de notre contrôle (préparation de mélanges, l'application, la météo, etc.) peuvent intervenir et affecter l'effet du produit.
- La société garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur est responsable des dommages causés (manque d'efficacité, de toxicité, les résidus, etc.) pour le non respect total ou partiel des instructions sur l'étiquette.
- Quand on est dans des situations à risque de phytotoxicité (Température élevée, nouvelle espèce ou variété) on recommande d'effectuer un essai à petite échelle afin d'éviter des dommages irréversibles à l'ensemble de la culture.
- Utiliser le produit uniquement là où il y a un besoin reconnu.
- Ne pas dépasser la dose recommandée.
- Il est recommandé de se référer à votre conseiller technique en agronomie.

REGLEMENT

Ce produit est conforme aux conditions fixées par le décret royal espagnol 506/2013, du 28 Juin, sur les engrais.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Produit non combustible et non comestible
- Eviter le contact avec la peau et les yeux
- Ne pas avaler ou inhaler
- L'exposition au produit n'engendre aucun symptôme grave
- En cas d'inhalation, mettre la personne à l'air frais
- En cas de contact avec la peau : rincer abondamment à l'eau et au savon et enlever les vêtements contaminés
- En cas de contact avec les yeux : rincer l'œil ouvert à l'eau courante pendant 15 minutes. Si la douleur persiste consulter le médecin le plus proche
- En cas d'ingestion : Rincer la bouche à l'eau, ne pas boire de l'eau ou un autre liquide. Ne pas induire le vomissement. Consulter le médecin le plus proche.
- manipuler avec les vêtements et équipements de protection : Gants, Lunettes et Blouse